




Opdualag[®]

(nivolumab en relatlimab)

Patiëntenkaart

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

 Bristol Myers Squibb™

Informatie voor patiënten

Draag deze kaart altijd bij u om zorgverleners die u eventueel behandelen (bijv. arts, verpleegkundige, apotheker, personeel van de afdeling spoedeisende hulp) te informeren dat u met Opdualag wordt behandeld.



BELANGRIJK

Opdualag kan ernstige immuungerelateerde bijwerkingen veroorzaken in verschillende delen van het lichaam. Deze bijwerkingen kunnen op elk moment optreden, kunnen met vertraging optreden en kunnen weken tot maanden na uw laatste dosis van de behandeling optreden. Sommige van de volgende bijwerkingen kunnen levensbedreigend zijn en moeten onmiddellijk worden behandeld:

Lichaamsdeel

Mogelijke bijwerkingen



Longen

Nieuwe of erger wordende hoest, niet goed kunnen ademen of pijn op de borst.



Maag en darm

Diarree (waterige, dunne of zachte stoelgang), vaker dan normaal naar de wc moeten; stoelgang die zwart, teerachtig of plakkerig is, of die bloed of slijm bevat; pijn of een gevoelige maag of buik.



Lever

Geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht), misselijkheid of overgeven, pijn aan de rechterbovenkant van de buik, donkere urine, snel moe zijn, sneller dan normaal bloedingen of blauwe plekken hebben.



Klieren die hormonen maken (inclusief suikerziekte en diabetische ketoacidose)

Hoofdpijn, meer zweten, veranderingen in uw gewicht, meer vermoeid zijn, meer honger of dorst, vaker moeten plassen, haaruitval, het koud hebben, constipatie (verstopping van de darmen), stemveranderingen, duizeligheid of flauwvallen, veranderingen in stemming of gedrag, gevoeligheid voor licht, oogproblemen, snelle hartslag, moeite met helder te denken, adem die zoet of fruitig ruikt, een zoete of metaalachtige smaak in uw mond, een andere geur van uw urine of zweet, ziek voelen of ziek zijn, maag (buik) pijn, en een diepe of snelle ademhaling.



Nieren

Verminderde hoeveelheid urine, zwelling van de enkels, verlies van eetlust of bloed in de urine.



Huid

Uitslag, jeuk, blaarvorming of schilferende huid; pijnlijke zweertjes in de mond.



Hart

Nieuwe of erger wordende pijn op de borst, onregelmatige en/of snelle hartslag, moeheid, zwelling van de enkels of niet kunnen ademen.



Algemeen/
Overig

Verward zijn, slaperigheid, geheugenproblemen, stijve nek, evenwichtsproblemen, tintelingen of gevoelloosheid van de armen of benen, dubbelzien, pijnlijke ogen, veranderingen in het zien, blijvende of ernstige spierpijn of spierzwakte, spierkrampen of vergrote lymfeklieren.



Als u een van de bovenstaande tekenen of klachten ervaart, of als de klachten aanhouden of worden ze erger, vertel dit dan **meteen** aan uw arts of verpleegkundige of zoek een andere medische hulp.

Immuungerelateerde bijwerkingen kunnen ook in andere organen en weefsels optreden. Deze patiëntenkaart beschrijft niet alle tekenen en klachten van problemen die verband houden met de behandeling met Opdualag. Krijgt u last van bijwerkingen, ook als deze niet op deze kaart of in de bijsluiters staan vermeld, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.



MEER INFORMATIE

- Vertel uw arts over eventuele eerdere of huidige medische aandoeeningen of eerdere/huidige behandelingen. Dit geldt ook als u een stamceltransplantatie met behulp van donorstamcellen (allogeen) hebt ontvangen of van plan bent een stamceltransplantatie te ontvangen of een orgaantransplantatie hebt ondergaan.
- Het is belangrijk dat een bijwerking snel wordt herkend en behandeld. Dit helpt bij een veilig gebruik van Opdualag. Als tekenen en klachten die mild lijken, niet worden behandeld, dan kunnen ze snel erger worden.
- Probeer **NIET** om zelf iets aan de klachten te doen. Het is erg belangrijk dat u uw arts of verpleegkundige om advies vraagt.
- Als u last heeft van bijwerkingen, heeft u mogelijk andere geneesmiddelen nodig om uw symptomen te verminderen of te voorkomen dat ze verergeren. Het kan ook zijn dat uw arts de behandeling met Opdualag moet uitstellen of volledig moet stoppen als u ernstige bijwerkingen krijgt.
- Lees voor meer informatie aandachtig de bijsluiters alvorens u het geneesmiddel OPDUALAG gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiters is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek "Zoek informatie over een vergund geneesmiddel" -> Zoeken -> OPDUALAG of bel Bristol Myers Squibb Medical Information op +32 2 352 76 11 of medicalinfo.belgium@bms.com.



BELANGRIJKE informatie voor zorgverleners

- Deze patiënt wordt behandeld met Opdualag, wat ernstige immuungerelateerde bijwerkingen kan veroorzaken die verschillende orgaansystemen kunnen aantasten en fataal kunnen zijn.
- Immuungerelateerde bijwerkingen kunnen op elk moment optreden, kunnen vertraagd optreden en kunnen zich weken tot maanden na stopzetting van de behandeling optreden.
- Vroege diagnose en een passende behandeling van immuungerelateerde bijwerkingen zijn essentieel om levensbedreigende complicaties tot een minimum te beperken.
- Overleg met een oncoloog of andere medisch specialist kan nuttig zijn voor de behandeling van orgaanspecifieke immuungerelateerde bijwerkingen.
- Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg moeten het samenvatting van de kenmerken van het product van Opdualag op de website www.fagg.be, rubriek "Zoek informatie over een vergund geneesmiddel" -> Zoeken -> OPDUALAG raadplegen of bellen met Bristol Myers Squibb Medical Information op +32 2 352 76 11 of medicalinfo.belgium@bms.com voor meer informatie.

Contactgegevens van de arts (die Opdualag heeft voorgeschreven). Invullen in HOOFDLETTERS.

Naam van arts: _____

Telefoonnummer kantoor: _____

Telefoon buiten kantooruren: _____

Mijn contactgegevens

Invullen in HOOFDLETTERS.

Mijn naam: _____

Mijn telefoonnummer: _____

Contactpersoon voor noodgevallen:

Naam: _____ Telefoonnummer: _____